新藤黄酸通过 PTEN-PI3K/AKT/VEGF/eNOS 信号通路干预人脐静脉内皮细胞血管生成的研究

高俊^{1,2},程卉^{1,2},李庆林^{1,2}

(1. 安徽中医药大学药学院,安徽合肥 230012;

2. 安徽中医药大学新安医学教育部重点实验室,安徽合肥 230038)

[摘要]目的 探究 PTEN-PI3K/Akt/VEGF/eNOS 信号通路在新藤黄酸(gambogenic acid,GNA)抑制人脐静脉内皮细胞(human umbilical vein endothelial, HUVECs)迁移中的作用。方法 倒置显微镜下观察 HUVECs 形态变化;Boyden chamber 实验以及细胞划痕实验观察 GNA 对 HUVECs 迁移能力的影响;硝酸还原酶法检测 NO 水平;Western blot 法检测 GNA 及 LY29400 预处理对 HUVECs 内磷脂酰肌醇 3 激酶(phosphatidylinositol 3 kinase, PI3K)、p-PI3K、蛋白激酶 B(protein kinase B,AKT)、p-AKT 表达水平的影响;HUVECs 转染 PTEN-siRNA 后,RT-PCR 实验检测 VEGF mRNA 的表达水平。结果 GNA 能有效抑制 HUVECs 迁移,其抑制效果与剂量相关($P < 0.05$)。GNA 和抑制剂 LY294002 以及 L-NAME 均能有效抑制 NO 的产生,且 GNA+LY294002 组、GNA+L-NAME 组抑制效果更好($P < 0.05$);Western blot 检测结果显示,GNA 上调 PTEN 蛋白表达水平,下调 eNOS、p-PI3K、p-AKT 蛋白表达水平($P < 0.05$)。RT-PCR 检测结果表明,PTEN-siRNA 转染后,GNA 能上调 VEGF mRNA 基因的表达水平($P < 0.05$)。结论 GNA 通过 PTEN-PI3K/Akt/VEGF/eNOS 信号传导通路,抑制 HUVECs 迁移,阻止 HUVECs 血管生成。

[关键词]新藤黄酸;人脐静脉内皮细胞;血管生成;分子机制

[中图分类号]R285.5 **[DOI]**10.3969/j.issn.2095-7246.2021.01.021

细胞迁移也称为细胞爬行,是正常细胞的基本功能之一,表现为细胞头部伪足延伸、建立新的黏附、细胞体尾部收缩的交替进行,是机体正常生长发

育的生理过程。细胞迁移涉及血管生成、癌症转移、炎症反应、动脉粥样硬化等过程。

肿瘤血管生成是从已存在的血管床中形成新生血管,是一个受众多生长因子调节的复杂的病理生理过程,多种细胞因子和细胞基质参与肿瘤的生长、转移、复发^[1]。其过程包括:肿瘤细胞与正常血管内皮细胞相互作用;肿瘤细胞与细胞外基质相互作用;

基金项目:国家自然科学基金项目(81673650,81903859)

作者简介:高俊(1995-),女,硕士研究生

通信作者:李庆林(1968-),男,博士,教授, qinglin_lee@hotmail.com

Rg1 at different doses for 14 consecutive days. The mice were sacrificed on day 35, and the spinal cord was collected to observe pathological changes such as inflammatory cell infiltration and demyelination. Flow cytometry was used to measure Th1, Th17, and Treg subsets in the mouse spleen, and ELISA was used to measure the levels of interleukin-17A (IL-17A), interferon- γ (IFN- γ), interleukin-6 (IL-6), and interleukin-10 (IL-10) in peripheral blood. **Results** Compared with the model group, the low-, middle-, and high-dose ginsenoside Rg1 groups had significant reductions in the score of nerve symptoms ($P < 0.05$), the scores of inflammatory cell infiltration and demyelination in the spinal cord ($P < 0.05$), and the percentages of CD4⁺, CD8⁺, Th1, and Th17 lymphocyte subsets in the spleen ($P < 0.05$) and a significant increase in the percentage of Treg (CD4⁺CD25⁺FoxP3⁺) ($P < 0.05$), as well as significant reductions in the levels of IFN- γ , IL-17A, and IL-16 in peripheral blood ($P < 0.05$) and a significant increase in the level of IL-10 ($P < 0.05$). Ginsenoside Rg1 exerted an effect in a significant dose-dependent manner. **Conclusion** Ginsenoside Rg1 can significantly improve clinical symptoms and reduce demyelination and inflammatory cell infiltration in the central nervous system in EAE mice, possibly by regulating the imbalance of Th17, Th1, and Treg subsets and inhibiting the expression of inflammatory cytokines.

[Key words] Ginsenoside Rg1; Autoimmune encephalomyelitis; Multiple sclerosis; Helper T cell; Regulatory T cell

相关细胞的参与及大量白细胞因子的调节,使得新生血管得以形成。抗肿瘤血管生成的主要机制:抑制促血管生成因子与配体的表达和结合及相应的信号传递途径,抑制血管内皮细胞的增殖、迁移,抑制基底膜的降解等^[2]。

藤黄是藤黄科植物藤黄的干燥树脂,具有攻毒蚀疮、破血散结等功效。现代研究表明,新藤黄酸(gambogenic acid, GNA)为藤黄中的活性成分之一,具有良好的抗肿瘤活性。本课题组前期研究发现, GNA对多种肿瘤细胞如人乳腺癌 MCF-7^[3]和人肝癌 BEL-7402 细胞^[4]的增殖均有抑制作用。近期实验研究^[5]表明, GNA对肿瘤的血管生成、侵袭转移也具有一定的抑制作用。本研究选择人肺腺癌 A549 细胞和人脐静脉内皮细胞(human umbilical vein endothelial, HUVECs)建立体外非直接接触式共培养体系,观察 GNA对 HUVECs 迁移能力的影响,探讨 GNA 抗人肺腺癌 A549 细胞侵袭转移的作用及 GNA 影响血管生成的信号转导机制,为 GNA 的开发和应用提供理论依据。

1 试剂与材料

1.1 细胞株 人肺腺癌细胞株 A549、HUVECs 购于中国科学院上海细胞库。

1.2 试剂 GNA(分子量为 630.8,纯度>98.0%,货号 B50231):上海源叶生物有限公司提供;胎牛血清(货号 16140071)、DMEM 高糖培养基(货号 12100046):美国 GIBCO 公司;Matrigel 胶(货号 356234):美国 BD 公司;Boyden 小室:美国康宁公司;聚碳酸酯膜孔径 8.0 μm , NO 检测试剂盒(货号 A012):南京建成生物工程研究所;LY294002、L-NAME(货号 S0006):江苏碧云天生物技术研究; β -actin、eNOS 抗体:美国 Santa Cruz Biotechnology; NS-siRNA、第 10 号染色体缺失的磷酸酶及张力蛋白同源的基因(phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten, PTEN) siRNA(序列: 5'-GGCUAAGUGAAGAUGACAATT-3'; 5'-UUGUCAUCUUCACUAGCCTT-3');上海吉玛生物工程公司; Lipofectamine 2000TM(货号 11668-019):美国 Invitrogen 公司。

1.3 仪器 细胞培养箱、-80 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱:日本 Sanyo 公司;倒置显微镜:日本 Olympus 公司;超净工作台:浙江苏净净化设备有限公司;灭菌锅:日本 Hirayama 公司;高速冷冻离心机:德国 Eppendorf;倒置荧光显微镜(DMI-6000B):德国徕卡公司;垂直电泳仪:上海天能科技有限公司。

2 方法

2.1 倒置显微镜下观察 GNA 对 HUVECs 形态的影响 取对数生长期的 HUVECs,消化和收集,将细胞密度调整为 6×10^4 mL,接种于 25 mL 培养瓶。37 $^{\circ}\text{C}$ 、5% CO_2 培养箱中培养 24 h 后,更换含有 GNA 的条件培养液,倒置显微镜下观察细胞并拍照。

2.2 改良的 Boyden chamber 检测 GNA 对 HUVECs 转移能力的影响 将 Matrigel 胶与预冷的无血清 DMEM 培养基按照 1:3 的比例稀释加至 Boyden 小室中,每孔容积为 50 μL ,冰上操作。条件培养箱孵育 5 h 后,向上室加入 200 μL 的 HUVECs 悬液,下室中加入 500 μL 的 A549 细胞悬液,置于 37 $^{\circ}\text{C}$ 、5% CO_2 培养 6 h 后加药,继续培养 24 h 后取出小室,清洗上室残留细胞,4% 多聚甲醛固定 30 min 后用 0.1% 结晶紫染液染色 25 min, PBS 洗涤 3 次,于倒置荧光显微镜下计数并拍照。

2.3 细胞划痕实验 于 6 孔板以每孔约 2×10^5 接种 HUVECs,待细胞长满 6 孔板,用无菌 200 μL 加样枪头垂直于 6 孔板均匀划痕,用 PBS 轻洗细胞 2~3 遍后进行 0 h 取样,此为空白对照组,加入含不同浓度 GNA 的条件培养基,24 h 后于倒置显微镜下取样。

2.4 NO 水平的检测 采用硝酸还原酶法检测 NO 水平。不同药物组作用 HUVECs 24 h 后吸弃细胞培养液,收集细胞后超声裂解,2 000 r/min 离心,收集上清,按照说明书的步骤操作,采用多功能酶标仪于 550 nm 处检测各组的吸光度。根据说明书提供的计算公式,计算细胞中 NO 的水平。

2.5 Western blot 法检测 GNA 及 LY29400 预处理对 HUVECs 内磷脂酰肌醇 3 激酶(phosphatidylinositol 3 kinase, PI3K)、p-PI3K、蛋白激酶 B(protein kinase B, AKT)、p-AKT 表达水平的影响 各组 HUVECs 分别处理 24 h 后,无菌细胞刮刮取细胞后,收集,离心提取总蛋白,进行 BCA 蛋白定量。每组样品总蛋白 25 μg ,经 12% SDS-PAGE 电泳,分离蛋白。转膜后 5% 脱脂奶粉常温封闭 3 h,一抗(稀释比例 1:1 000)4 $^{\circ}\text{C}$ 孵育过夜。TBST 漂洗 3 次,每次 10 min,二抗常温孵育 2 h,再用 TBST 漂洗 3 次,每次 10 min,加入 ECL 发光底物,曝光,采用平均灰度值比较各组蛋白的表达水平。

2.6 PTEN-siRNA 转染细胞,琼脂糖凝胶电泳检测血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)表达水平 取对数生长期的 A549 细胞 1×10^6 /mL 接种至 6 孔板,每孔加入 1.8 mL 无抗生素的培养基,37 $^{\circ}\text{C}$ 、5% CO_2 培养箱孵育过夜。弃去 6

孔板中旧培养基, PBS洗2次, 各孔加入不含抗生素培养液1.8 mL, 按说明书操作配制好转染试剂并加入, 轻轻混匀后培养箱培养6 h, 倒置荧光显微镜下拍照, 观察转染效率。提取总RNA, 逆转录PCR, 分别将VEGF、 β -actin扩增产物(见表1)各5 μ L与1 μ L

6 $\times$ SDS上样缓冲液混匀后, 用移液器加样, 电压90 V, 电泳约40 min, 取胶放置在凝胶成像系统上, 紫外光下拍照, 采用Biocapt MV软件测定吸光度(A), 采用Image J分析各组条带光密度值, 并采用Graphpad 5.0作图。

表1 VEGF、 β -actin基因引物表

PCR引物	引物序列	扩增片段长度/bp
VEGF	上游引物: 5'-CCTTCCCGAGGCACAGAGAG-3'	341
	下游引物: 5'-GGAGGGCAGAGCTGAGTGTT-3'	
β -actin	上游引物: 5'-GCCGGACCTGACTGACTAC-3'	471
	下游引物: 5'-CGGAGTACTTGCCTCAGGA-3'	

2.7 统计学方法 实验重复3次并采用Graph Pad Prism 6等软件进行数据统计分析。结果采用“均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)”进行统计学描述。多组间均数比较采用单因素方差分析。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 条件培养基的制备 将A549细胞 2×10^5 接种于75 mL培养瓶, 12 h后取培养液, 离心后取上清, 再加入10%胎牛血清, -20°C 冻存备用。使用前加入不同浓度的GNA, 此为HUVECs的条件培养基。

3.2 倒置显微镜下观察GNA对HUVECs形态的影响 空白对照组中细胞贴壁牢固, 折光性强; 1 $\mu\text{mol/L}$ GNA组细胞核固缩变圆, 体积变小, 贴壁细胞有少量出现漂浮现象; 2 $\mu\text{mol/L}$ GNA组少数细胞体积变大, 折光性明显变弱, 细胞呈现坏死状态; 4 $\mu\text{mol/L}$ GNA组大量细胞固缩变圆, 漂浮于培养液中。见图1。

察, 与空白对照组相比, 2 $\mu\text{mol/L}$ GNA组和50 $\mu\text{mol/L}$ LY294002组可以降低细胞迁移数目($P<0.05$); 与空白对照组及2 $\mu\text{mol/L}$ GNA组相比, 2 $\mu\text{mol/L}$ GNA+50 $\mu\text{mol/L}$ LY294002组能够显著降低细胞迁移数目($P<0.05$)。见图2、表2。

注: A. 空白对照组; B. 2 $\mu\text{mol/L}$ GNA组; C. 50 $\mu\text{mol/L}$ LY294002组; D. 2 $\mu\text{mol/L}$ GNA+50 $\mu\text{mol/L}$ LY294002组

图2 Boyden小室实验观察GNA对HUVECs迁移的影响(结晶紫染色, 10 $\times$ 20倍)

表2 Boyden小室实验观察GNA对HUVECs迁移的影响($\bar{x}\pm s$)

组别	n	迁移率/%
空白对照	3	236.33 $\pm$ 4.04
2 $\mu\text{mol/L}$ GNA	3	142.33 $\pm$ 10.02*
50 $\mu\text{mol/L}$ LY294002	3	127.33 $\pm$ 5.03*
2 $\mu\text{mol/L}$ GNA+50 $\mu\text{mol/L}$ LY294002	3	75.33 $\pm$ 11.15* [#]

注: 与空白对照组比较, * $P<0.05$; 与2 $\mu\text{mol/L}$ GNA组比较, [#] $P<0.05$

注: A. 空白对照组; B. 1.0 $\mu\text{mol/L}$ GNA组; C. 2.0 $\mu\text{mol/L}$ GNA组; D. 4.0 $\mu\text{mol/L}$ GNA组

图1 倒置显微镜下观察GNA对HUVECs形态的影响(10 $\times$ 20倍)

3.3 Boyden小室实验观察GNA对HUVECs迁移的影响 倒置荧光显微镜下观察发现, 接种至Boyden小室上室中的细胞, 5~6 h后开始贴附于凝固的Matrigel胶上, 24 h后倒置荧光显微镜下观

3.4 细胞划痕实验观察GNA对HUVECs划痕愈合的影响 实验24 h后, GNA各处理组较空白对照组划痕愈合变慢($P<0.05$)。结果表明, GNA可抑制HUVECs的划痕愈合, 并且呈一定的剂量依赖性, 见图3、表3。

3.5 GNA对不同抑制剂处理的HUVECs中NO水平的影响 LY294002及L-NAME抑制剂作用

图3 细胞划痕实验观察 GNA 对 HUVECs 划痕愈合的影响(结晶紫染色,10×20倍)

表3 细胞划痕实验观察 GNA 对 HUVECs

划痕愈合的影响($\bar{x} \pm s$)

组别	n	迁移率/%
空白对照	3	85.98±10.71
1 μmol/L GNA	3	58.58±11.29*
2 μmol/L GNA	3	34.94±6.16* [#]
4 μmol/L GNA	3	15.83±4.88* ^{#△}

注:与空白对照组比较,* $P<0.05$;与1 μmol/L GNA组比较,[#] $P<0.05$;与2 μmol/L GNA组比较,[△] $P<0.05$

HUVECs后,采用硝酸还原酶法测定NO含量,判断GNA对内皮型一氧化氮合酶(endothelial nitric oxide synthase, eNOS)活力的影响。实验结果显示,2 μmol/L GNA组能够显著降低NO水平($P<0.05$),与PI3K抑制剂LY294002组效果接近,且2 μmol/L GNA+50 μmol/L LY294002组NO水平更低($P<0.05$)。见表4。与空白对照组比较,GNA组、L-NAME组NO水平显著降低($P<0.05$),且GNA+L-NAME组NO水平更低($P<0.05$)。见表5。

表4 GNA及PI3K抑制剂对细胞培养上清中

NO水平的影响($\bar{x} \pm s$)

组别	n	NO/(μmol/L)
空白对照	3	6.58±0.41
2 μmol/L GNA	3	3.29±0.42*
LY294002	3	2.47±0.41*
2 μmol/L GNA+50 μmol/L LY294002	3	1.10±0.63* [#]

注:与空白对照组比较,* $P<0.05$;与2 μmol/L GNA组比较,[#] $P<0.05$

表5 GNA及L-NAME对HUVECs上清中

NO水平的影响($\bar{x} \pm s$)

组别	n	NO/(μmol/L)
空白对照	3	8.00±1.37
2 μmol/L GNA	3	4.90±0.52*
L-NAME	3	3.92±0.52*
L-NAME+2 μmol/L GNA	3	1.68±0.34* [#]

注:与空白对照组比较,* $P<0.05$;与2 μmol/L GNA组比较,[#] $P<0.05$

3.6 Western blot 实验检测结果

3.6.1 Western blot 法检测 GNA 对 HUVECs 内 PI3K、p-PI3K、AKT 和 p-AKT 蛋白表达水平的影响 Western blot 实验结果显示,GNA 作用 HUVECs 后,p-PI3K 和 p-AKT 蛋白表达水平随着药物浓度的增加呈剂量依赖性下降($P<0.05$);而 PI3K 和 AKT 蛋白表达水平基本不变。见图4、表6。

3.6.2 GNA 对 LY294002 预处理 HUVECs 相关蛋白表达水平的影响 为了进一步研究 GNA 对 HUVECs 迁移的信号转导通路,本研究检测 PI3K/AKT 的上游负性调控蛋白 PTEN 的表达水平,见图5。同时,采用 PI3K 特异性抑制剂 LY294002 和不同浓度的 GNA 作用 HUVECs 24 h 后,检测 eNOS 的含量变化,见图6。结果表明,细胞内 PTEN 蛋白的表达水平随着 GNA 浓度的增加而呈浓度依赖性增加($P<0.05$),见表7。2 μmol/L GNA 作用 HUVEC 24 h 后,eNOS 表达水平下降($P<0.05$),而 PI3K 抑制剂 LY294002 与 GNA 联合使用具有协同作用,促进 eNOS 蛋白表达水平进一步降低($P<0.05$),见表8。

注:A.空白对照组;B.1 μmol/L GNA组;C.2 μmol/L GNA组;D.4 μmol/L GNA组

图4 GNA 对 HUVECs 内 p-PI3K、PI3K 和 p-AKT、AKT 蛋白表达水平的影响

表 6 GNA 对 HUVECs 内 p-PI3K、PI3K、p-AKT、AKT 蛋白相对表达水平的影响($\bar{x} \pm s$)

组别	n	PI3K	AKT	p-PI3K	p-AKT	p-PI3K/PI3K	p-AKT/AKT
空白对照	3	0.73±0.02	1.00±0.01	0.73±0.01	0.75±0.04	1.00±0.04	0.75±0.03
1 μmol/L GNA	3	0.72±0.02	0.98±0.03	0.51±0.02*	0.51±0.01*	0.71±0.03*	0.52±0.02*
2 μmol/L GNA	3	0.73±0.04	1.01±0.04	0.35±0.03*#	0.43±0.03*#	0.47±0.06*#	0.42±0.02*#
4 μmol/L GNA	3	0.71±0.04	1.04±0.05	0.10±0.02*#△	0.24±0.04*#△	0.19±0.03*#△	0.23±0.03*#△

注:与空白对照组比较,* $P < 0.05$;与 1 μmol/L GNA 组比较,# $P < 0.05$;与 2 μmol/L GNA 组比较,△ $P < 0.05$

注:A.空白对照组;B. 1 μmol/L GNA 组;C. 2 μmol/L GNA 组;D. 4 μmol/L GNA 组

图 5 GNA 对 HUVECs 血管生成相关蛋白 PTEN 表达水平的影响

表 7 GNA 对 HUVECs 血管生成相关蛋白 PTEN 相对表达水平的影响($\bar{x} \pm s$)

组别	n	PTEN
空白对照	3	0.11±0.01
1 μmol/L GNA	3	0.39±0.04*
2 μmol/L GNA	3	0.60±0.13*#
4 μmol/L GNA	3	0.73±0.01*#

注:与空白对照组比较,* $P < 0.05$;与 1 μmol/L GNA 组比较,# $P < 0.05$

注:A.空白对照组;B. 2 μmol/L GNA 组;C. 50 μmol/L LY294002 组;D. 2 μmol/L GNA+50 μmol/L LY294002 组

图 6 GNA 对 HUVECs 血管生成相关蛋白 eNOS 表达水平的影响

表 8 GNA 对 HUVECs 血管生成相关蛋白 eNOS 相对表达水平的影响($\bar{x} \pm s$)

组别	n	eNOS
空白对照	3	1.61±0.11
2 μmol/L GNA	3	1.23±0.08*
50 μmol/L LY294002	3	1.59±0.10*
50 μmol/L LY294002+2 μmol/L GNA	3	0.12±0.05*#

注:与空白对照组比较,* $P < 0.05$;与 2 μmol/L GNA 组比较,# $P < 0.05$

3.7 GNA 对转染 PTEN-siRNA 的 HUVEC 中 VEGF mRNA 表达水平的影响 电泳图和 Image J 软件的分析结果显示,与空白对照组比较,GNA 组能下调 VEGF mRNA 的表达水平($P < 0.05$),而与 GNA 组比较,PTEN-siRNA 组及 PTEN-siRNA + GNA 组 VEGF mRNA 的表达水平上调($P < 0.05$)。见图 7、表 9。

注:A. maker;B. 空白对照组;C. GNA 组;D. PTEN-siRNA 组;E. PTEN-siRNA+GNA 组

图 7 GNA 对转染 PTEN-siRNA 的 HUVEC 中 VEGF mRNA 表达水平的影响

表 9 GNA 对转染 PTEN-siRNA 的 HUVEC 中 VEGF mRNA 相对表达水平的影响($\bar{x} \pm s$)

组别	n	VEGF
空白对照	3	0.85±0.09
GNA	3	0.48±0.05*
PTEN-siRNA	3	0.87±0.04#
PTEN-siRNA+GNA	3	0.88±0.08#

注:与空白对照组比较,* $P < 0.05$;与 GNA 组比较,# $P < 0.05$

4 讨论

PI3K 家族是细胞内重要的信号传导分子,参与调控多种信号通路^[6]。PI3K/AKT 信号通路在人类肿瘤谱中广泛失调,IA 型 PI3K 和其下游分子 AKT 所组成的信号通路不仅调节肿瘤细胞的增殖和存活,与肿瘤的血管新生过程、侵袭转移行为也密切相关。PI3K/AKT 信号通路受多种因子的调节,主要为负调节分子,如 PTEN 等抑癌蛋白。PTEN 所编码的蛋白能使 PIP3 去磷酸化,阻断 PI3K/AKT 信号通路,从而促进细胞凋亡、抑制细胞增殖、抑制肿瘤血管新生和肿瘤迁移等作用。Jiang 等^[7]研究表明,PI3K/AKT 信号通路参与了血管生成,PTEN 可抑制这种效应。而 PI3K/AKT 通路与 VEGF 之间的关联在肿瘤血管生成中发挥了重要作用^[8]。研究表明,VEGF 在多种肿瘤中高度表达^[9],其通过诱导内皮细胞增殖、迁移,促进血管外基质降解等途径促进肿瘤血管生成^[10]。VEGF 可提高血管通透性,促进血浆蛋白渗漏形成血管外纤维蛋白基质,为内皮细胞迁移提供网架;在多种细胞因子和蛋白酶协同作用下,使迁移出的内皮细胞延伸形成新生血管;经活化的蛋白水解酶降解肿瘤边缘细胞外基质,促使肿瘤细胞外渗而形成转移^[11-13]。

PI3K/AKT 不仅是机体内重要的信号调控途径之一, 并且是调控 eNOS 的关键信号途径之一^[14-15]。目前研究^[16-17]表明, 第一个明确由 AKT 作用的促进血管形成的物质是 eNOS。其表达与肿瘤侵袭和迁移、肿瘤血管分化和形成关系密切^[18]。AKT 调节 eNOS 活性, 与血管生成关系密切, 在 VEGF 的作用下, 活化的 AKT 和 eNOS 结合, eNOS 被磷酸化丝氨酸激活, 产生 NO, 从而引起血管舒张、血管重塑和血管生成。Ma 等^[19]研究发现, PI3K/AKT 的负调节分子 PTEN 可通过 PI3K/AKT/VEGF/eNOS 信号通路抑制肿瘤血管生成。

本课题组前期研究结果表明, GNA 能够下调 HUVECs 的 p-PI3K, p-AKT 蛋白的表达水平且呈剂量依赖性, 与对照组比较, 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。同时, 采用 PI3K 特异性抑制剂 LY294002 处理细胞后, Western blot 法检测表明 VEGF 的蛋白表达水平显著下调, 提示 GNA 抑制血管生成与 PI3K/AKT 信号通路有关, 且下游通路中 VEGF 起着非常关键的作用。本实验在此基础上, 通过抑制剂 LY294002 预处理 HUVECs, Western blot 法检测 HUVECs 内 PTEN、eNOS 蛋白水平的表达变化, 结果显示, PTEN 蛋白表达水平随着 GNA 的浓度增加而增加, eNOS 蛋白表达水平下降, 且 GNA 2 $\mu\text{mol/L}$ 与 LY294002 联用后作用更强。用 Boyden chamber 小室分析 GNA 以及 LY294002 对 HUVEC 转移能力的影响, 发现 GNA 以及 LY294002 都能抑制细胞转移。细胞划痕愈合实验结果表明, 不同浓度 GNA 均可抑制血管内皮细胞迁移, 且呈剂量依赖性。采用 LY294002 和 eNOS 特异性抑制剂 L-NAME 处理细胞, 硝酸还原酶法检测 eNOS 的表达水平, 结果表明, 2 $\mu\text{mol/L}$ GNA 和 LY294002 联用以及 2 $\mu\text{mol/L}$ GNA 和 L-NAME 联用均能显著降低 eNOS 的含量; RT-PCR 结果表明, 沉默 PTEN 基因会促进 VEGF 表达水平的上调。

综上所述, GNA 可能通过 PTEN-PI3K/AKT/VEGF/eNOS 通路影响 HUVECs 的迁移和血管形成。

参考文献:

[1] CARMELIET P. Angiogenesis in health and disease [J]. *Nat Med*, 2003, 9(6):653-660.

[2] FERRARA N, KERBEGEL R S. Angiogenesis as a therapeutic target[J]. *Nature*, 2005, 438(7070):967-974.

[3] 谢晨焯, 张凤, 程卉, 等. 新藤黄酸联合阿霉素诱导人乳腺癌 MCF-7 细胞凋亡的研究[J]. *安徽中医药大学学报*, 2015, 34(1):51-55.

[4] 展凡, 王玉涵, 王萌, 等. 新藤黄酸抑制人肝癌细胞 BEL-7402 自噬作用研究[J]. *安徽中医药大学学报*, 2020, 39(3):46-50.

[5] 程卉, 王云龙, 苏婧婧, 等. 新藤黄酸体外抗肺癌血管生成的作用机制研究[J]. *中国中药杂志*, 2018, 43(21):4311-4316.

[6] FANG J, DING M, YANG L, et al. PI3K/PTEN/AKT signaling regulates prostate tumor angiogenesis[J]. *Cell Signal*, 2007, 19(12):2487-2497.

[7] JIANG B H, ZHENG J Z, AOKI M. Phosphatidylinositol 3-kinase signaling mediates angiogenesis and expression of vascular endothelial growth factor in endothelial cells[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2000, 97(4):1749-1753.

[8] De AMICIS F, AQUILA S, MORELLI C, et al. Ber-gapten drives autophagy through the up-regulation of PTEN expression in breast cancer cells[J]. *Mol Cancer*, 2015, 14:130.

[9] BALARATNASINGAM C, DHRAMI-GAVAZI E, MCCANN J T, et al. Aflibercept: a review of its use in the treatment of choroidal neovascularization due to age-related macular degeneration[J]. *Clin Ophthalmol*, 2015, 9:2355-2371.

[10] MAHENDRA G, KUMAR S, ISAYEVA T, et al. Antiangiogenic cancer gene therapy by adeno-associated virus 2-mediated stable expression of the soluble FMS-like tyrosine kinase-1 receptor[J]. *Cancer Gene Ther*, 2005, 12(1):26-34.

[11] HUANG M, HUANG B, LI G, et al. Apatinib affect VEGF-mediated cell proliferation, migration, invasion via blocking VEGFR2/RAF/MEK/ERK and PI3K/AKT pathways in cholangiocarcinoma cel [J]. *BMC Gastroenterol*, 2018, 18(1):169.

[12] JUNG Y D, KIM M S, SHIN B A, et al. EGCG, a major component of green tea, inhibits tumour growth by inhibiting VEGF induction in human colon carcinoma cells[J]. *Br J Cancer*, 2011, 104(6):844-850.

[13] YU W, HEGARTY J P, BERG A, et al. NKX2-3 transcriptional regulation of endothelin-1 and VEGF signaling in human intestinal microvascular endothelial cells [J]. *PLoS One*, 2011, 6(5):e20454.

[14] TAGASHIRA H, MATSUMOTO T, TAGUCHI K, et al. Vascular endothelial σ 1-receptor stimulation with SA4503 rescues aortic relaxation via Akt/eNOS signaling in ovariectomized rats with aortic banding[J]. *Circ J*, 2013, 77(11):2831-2840.

[15] YU J, WANG Q, WANG H, et al. Activation of liver X receptor enhances the proliferation and migration of endothelial progenitor cells and promotes vascular repair

- through PI3K/Akt/eNOS signaling pathway activation [J]. *Vascul Pharmacol*, 2014, 62(3):150-161.
- [16] ZHENG Y Q, WU Z Z, YI F, et al. By activating Akt/eNOS bilobalide B inhibits autophagy and promotes angiogenesis following focal cerebral ischemia reperfusion [J]. *Cell Physiol Biochem*, 2018, 47(2):604-616.
- [17] AHMAD K A, ZE H, CHEN J C, et al. The protective effects of a novel synthetic β -elemene derivative on human umbilical vein endothelial cells against oxidative stress-induced injury; involvement of antioxidation and PI3k/Akt/eNOS/NO signaling pathways [J]. *Biomed Pharmacother*, 2018, 106:1734-1741.
- [18] 李牧, 王丽, 刘海莉, 等. 姜黄素通过降低一氧化氮合酶水平抑制宫颈癌 HeLa 细胞的侵袭和转移 [J]. *南方医科大学学报*, 2013, 33(12):1752-1756.
- [19] MA J, SAWAI H, OCHI N, et al. PTEN regulate angiogenesis through PI3K/Akt/VEGF signaling pathway in human pancreatic cancer cells [J]. *Mol Cell Biochem*, 2009, 331(1-2):161-171.

(收稿日期:2020-08-05)

Gambogenic Acid Intervenes Against Angiogenesis in Human Umbilical Vein Endothelial Cells via the PTEN-PI3K/AKT/VEGF/eNOS Signaling Pathway

GAO Jun^{1,2}, CHENG Hui^{1,2}, LI Qing-lin^{1,2}

(1. School of Pharmacy, Anhui University of Chinese Medicine, Anhui Hefei 230012, China; 2. Key Laboratory of Xin'an Medicine, Ministry of Education, Anhui University of Chinese Medicine, Anhui Hefei 230038, China)

[Abstract] Objective To investigate the role of the PTEN-PI3K/Akt/VEGF/eNOS signaling pathway in the inhibition of the migration of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) by gambogenic acid (GNA). **Methods** An inverted microscope was used to observe the morphological changes of HUVECs; Boyden chamber experiment and wound-healing assay were used to observe the effect of GNA on the migration ability of HUVECs; the nitrate reductase method was used to measure the level of nitric oxide (NO); Western blot was used to measure the effect of GNA and LY294002 pretreatment on the expression levels of phosphoinositide 3-kinase (PI3K), phosphorylated PI3K (p-PI3K), protein kinase B (AKT), phosphorylated AKT (p-AKT) in HUVECs; after HUVECs were transfected with PTEN-siRNA, RT-PCR was used to measure the mRNA expression of vascular endothelial growth factor (VEGF). **Results** GNA effectively inhibited the migration of HUVECs in a dose-dependent manner ($P < 0.05$). GNA and the inhibitors LY294002 and L-NAME effectively inhibited the production of NO, and the GNA + LY294002 group and the GNA + L-NAME group had a significantly better inhibitory effect ($P < 0.05$). Western blot showed that GNA up-regulated the protein expression of PTEN and downregulated the protein expression of endothelial nitric oxide synthase, p-PI3K, and p-AKT ($P < 0.05$). RT-PCR showed that after PTEN-siRNA transfection, there was a significant increase in the mRNA expression of VEGF ($P < 0.05$). **Conclusion** GNA inhibits the migration of HUVECs and prevents angiogenesis in HUVECs via the PTEN-PI3K/Akt/VEGF/eNOS signaling pathway.

[Key words] Gambogenic acid; Human umbilical vein endothelial cell; Angiogenesis; Molecular mechanism